



# Erdbeeren: Fungizide – 2021.1

Nach der Ernte bzw. nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Erste neue Blätter	Blütenstand- schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weiss Früchte	Beginn der Rotfärbung der Früchte	Wartefrist
<b>Produkte ohne Wartefrist</b> (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)								
<b>Ridomil Gold:</b> Rhizomfäule, Rote Wurzelfäule <i>max. 1 Beh.</i> (angiesen bei Pflanzung)								
<b>Alial, Alette WG, Alfil WG:</b> Rhizomfäule, Rote Wurzelfäule, <i>max. 4 Beh.</i>								
<b>Stamina S, Booster, Quartet Lux:</b> Rhizomfäule, Rote Wurzelf., Lederf., <i>max. 3 Beh.*</i>								
<b>Kupfer:</b> pilzliche Blattfleckenkrankheit, Teilwirkung: Eckige Blattfleckenkrankheit								
<b>SSH:</b> Systhane C WG, Duotop Plus: Echter Mehltau, Blattfl.krankheiten, <i>max. 4 Beh.</i>								
<b>Schwefel:</b> Echter Mehltau								
<b>Thiram 80:</b> Teilwirkung: Blattflecken- krankheit, Schwarze Fruchtfäule								
<b>Produkte mit Wartefrist</b> (Anwendung mit Wartefrist)								
<b>Aliette WG:</b> Lederf., <i>max. 3 Beh.</i>								4 Wochen
<b>SSH:</b> Slick, Difcor 250 EC, Bogard, SICO: Echter Mehltau, <i>max. 3 Beh.</i> <b>Systhane Viti 240, Topas, Topas vino:</b> Echter Mehltau, <i>max. 4 Beh.</i>								3 Wochen
<b>Stamina S, Booster, Quartet Lux:</b> Teilwirkung: Lederfäule, <i>max. 3 Beh.*</i>								
<b>Legend:</b> Echter Mehltau, <i>max. 4 Beh. (max. 2 Beh. nach Blüte)</i>								
<b>Strobilurine:</b> Flint, Tega: Echter Mehltau, Blattfleckenkrankheiten, Teilwirkung: Grau- fäule, <i>max. 3 Behandlungen</i> <b>Amistar:</b> Echter Mehltau, Teilwirkung: Graufäule, <i>max. 3 Behandlungen</i> <b>Stroby, Stroby WG:</b> Echter Mehltau, <i>max. 3 Behandlungen</i>								
<b>Strobilurine + SDHI:</b> Moon Sensation: Schwarze Fruchtfäule,  Blattfleckenkrankheiten, Echter Mehltau, Lederfäule, Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>								2 Wochen
<b>SDHI:</b> Moon Privilege: Blattfleckenkrankheiten, Echter Mehltau, Graufäule, <i>max. 2 Beh.</i>								
<b>Anilinopyrimidine:</b> Frupica SC, Pyrus 400 SC, Papyrus, Espiro: Graufäule, <i>max. 1 Beh.</i>								
<b>Switch, Play, Avatar:</b> Graufäule, <i>max. 2 Beh.</i> 								
<b>SDHI + SSH:</b> Dagonis, Taifen: Echter Mehltau, <i>max. 3 Behandlungen</i> 								1 Woche
<b>Nimrod:</b> Echter Mehltau								

\* **Zu beachten:** Die max. Anzahl von **3 Behandlungen** für die Produkte Stamina S, Booster, Quartet Lux (Wirkstoff: Kaliumphosphanat) gilt für die **Spritz- & Giessanwendung zusammengezählt.**

**Zu beachten:** Für das Fungizidresistenz-Management wird die Anzahl Behandlungen **pro Wirkstoffgruppe** beschränkt. Diese gilt für Solo-Formulierungen und für Kombinationen mit anderen Wirkstoffen. Die Gruppen sind farbig gekennzeichnet.

- 1) SSH Difeconazol: max. 3 Beh. mit diesem Wirkstoff wegen seiner Wirkung auf Bodenorganismen.
- 2) Für die Anilinopyrimidine (grün) gelten die Einschränkungen nicht für die Gruppe, sondern per Wirkstoff.

Nach der Ernte bzw. nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Erste neue Blätter	Blütenstand- schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weiss Früchte	Begin der Rotfärbung der Früchte	Wartezeit
<b>Armcarb, Capito Armcarb, BIOHOP FungiCARB, Carbofort:</b> Echter Mehltau; <b>Vitisan, Kalisan:</b> Teilwirkung: Echter Mehltau								3 Tage
			<b>Teldor:</b> Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>					
			<b>Saphire:</b> Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>					
			<b>Prolectus:</b> Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>					
<b>Vacciplant:</b> Echter Mehltau, <u>Teilwirkung:</u> Graufäule (Graufäule: <i>max. 4 Beh.</i> )								0 Tag
			<b>FytoSave, Auralis:</b> <u>Teilwirkung:</u> Echter Mehltau (nur Gewächshaus)					
			<b>Amylo-X:</b> Graufäule					
			<b>Serenade ASO:</b> <u>Teilwirkung:</u> Graufäule (nur Gewächshaus)					
			<b>Prestop:</b> <u>Teilwirkung:</u> Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>					

# Erdbeeren: Insektizide/Akarizide 2021

Quelle: Agroscope

Nach der Ernte bzw. nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Winterruhe	Erste neue Blätter	Blütenstand-schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weiss Früchte	Begin der Rotfärbung der Früchte	Wartefrist
<b>Produkte ohne Wartefrist</b> (vor Blüte oder nach Ernte)									
		Genol Plant, Sanoplant Winteröl: Spinnmilben, Blattläuse							
Ende August - Anfangs Sept. Apollo SC: Spinnm. (Eier); <b>max. 1 Beh.</b> Credo, Nissostar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen); <b>max. 1 Beh.</b>		Apollo SC: Spinnm. (Eier); <b>max. 1 Beh.</b> Credo, Nissostar: Spinnm. (Eier, Larven, Nymphen); <b>max. 1 Beh.</b>							
Envidor: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen); <b>max. 1 Beh.</b> Movento SC: Spinnmilben, Erdbeermilben; <b>max. 1 Beh.</b>		Envidor: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen); <b>max. 1 Beh.</b> Movento SC: Spinnm., Erdbeermilben, Weisse Fliegen, Blattläuse (Röhrenläuse); <b>max. 1 Beh.</b>							
				<b>Produkte mit Wartefrist</b> (Anwendung mit Wartefrist)					
Zenar, Kiron (HG), Spomil (K): Erdbeermilben, Spinnmilben (alle Stadien); <b>max. 1 Beh.</b>		Zenar, Kiron (HG), Spomil (K): Erdbeermilben, Spinnmilben; <b>max. 1 Beh.</b>							3 Wochen
		Pirimicarb, Pirimor: Blattläuse; <b>max. 2 Beh.</b> ●							
		Pyrethrum FS, Parexan N, Sepal : Blattläuse , Raupen							
		Alanto: Blattläuse, Blütenstecher; <b>max. 2 Beh.</b> ○							
		Pyrethroide (versch. Produkte): Thrips, Blütenstecher, <b>max. 2 Beh.</b>							
						Fettsäuren: Spinnmilben, Blattläuse			1 Woche
						Vertimec Gold, Milbeknock: Spinnm., Erdbeerm.; <b>max. 1 Beh.</b>			
						Acramite: Spinnmilben (Eier, Larven), <b>max. 1 Beh.</b>			3 Tage
						Arabella: Spinnmilben (Eier, Larven), <b>max. 1 Beh.</b>			
						Telmion (WS Rapsöl): Spinnmilben, <b>max. 2 Beh.</b>			
						Audienz, Biohop Audienz: Thrips, <b>max. 2 Beh.</b>			
							Audienz, Biohop Audienz, Perfetto: Kirschessigfliege, <b>max. 2 Beh.</b>		

**Zu beachten:** Für das Insektizidresistenz-Management wird die Anzahl Behandlungen pro **Wirkstoffgruppe** beschränkt. Diese Gruppen sind farbig gekennzeichnet.