


# Bekämpfungszeiträume in Himbeeren 2021



# Himbeeren: Fungizide - 2021

Quelle: Agroscope

Nach der Ernte bzw. nach einer Neupflanzung bzw. nach dem Austrieb	Erste neue Blätter	Blütenstand-schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Beginn Fruchtverfärbung	Früchte gefärbt	Wartefrist	
<b>Produkte ohne Wartefrist</b> (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)									
Ridomil Gold, Ridomil Vino: Wurzelfäule;		<i>max. 2 Giessbehandlungen</i>							
Kupfer: Rutenkrankheiten									
<b>SSH: Slick:</b> Himbeerrost;		<i>max. 3 Behandlungen</i>							
<b>Strobilurine: Flint:</b> Himbeerrost, Rutenkrankheiten;		<i>max. 3 Behandlungen</i>							
Captan S WG: Rutenkrankheiten; nur nach Ernte									
<b>Produkte mit Wartefrist</b> (Anwendung mit Wartefrist)									
<b>Strobilurine: Amistar:</b> Teilwirkung: Rutenkrankheiten;		<i>max. 3 Behandlungen</i>							3 Wochen
<b>Strobilurine + SDHI: Moon Sensation:</b> Rutenkrankheiten, Graufäule, Rost;		<i>max. 2 Behandlungen</i> ●							2 Wochen
<b>Strobilurine + SDHI:</b> Signum: Graufäule;		<i>max. 2 Beh. (nur Freiland)</i> ●							
<b>Anilinopyrimidine:</b> Frupica SC: Graufäule;		<i>max. 1 Beh.</i>							
<b>Anilinopyrimidine:</b> Pyrus 400 SC, Papyrus, Espiro: Graufäule;		<i>max. 1 Beh.</i>							
<b>Anilinopyrimidine + Phenylpyrrol:</b> Switch, Play, Avatar: Graufäule;		<i>max. 2 Beh.</i> ●							1 Woche
Teldor: Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>									3 Tage
<b>Strobilurine + SDHI: Signum:</b> Echter Mehltau;		<i>max. 2 Behandlungen</i> ●							3 Tage
Armicarb, Capito Armicarb, BIOHOP FungiCARB, Carbofort: Echter Mehltau ( <i>nur Freiland</i> )									3 Tage

**Zu beachten:** Die Anzahl Behandlungen bezieht sich immer auf eine **Wirkstoffgruppe**, siehe dazu die detaillierten Erläuterungen im Schema „Erdbeeren – Fungizide“.

# Himbeeren: Insektizide/Akarizide 2021

Quelle: Agroscope

Nach der Ernte bzw. nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Winterruhe	Erste neue Blätter	Blütenknospen sichtbar	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Beginn Fruchtverfärbung	Früchte gefärbt	Wartefrist
<b>Produkte ohne Wartefrist</b> (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)									
		<b>Genol Plant, Sanoplant</b> Winteröl: Spinnmilben, Schildl., Blattl.							Bis zum Austrieb
		<b>Paraffinöle (versch.):</b> Spinnmilben, Schildl., Raupen							
		<b>Rapisal, Rappol Plus:</b> Spinnm., Blattm., Blattl.; <i>max. 3 Beh.</i>							
		<b>Milbeknock:</b> Spinnmilben, Himbeerblattmilbe, Brombeermilbe, Gallmilbe; <i>max. 1 Beh.</i>							
<b>Kanemite:</b> Spinnmilben, Himbeerblattmilbe, Brombeermilbe, Gallmilbe; <i>max. 1 Beh.</i>		<b>Gazelle SG, Barritus Rex, Basudin SG, Oryx Pro:</b> Gallmücken; <i>max. 2 Beh.</i>							
<b>Ende August- Anfangs Sept.</b> <b>Apollo SC:</b> Spinnmilben (Eier); <i>max. 1 Beh.</i> <b>Credo, Nissostar:</b> Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen); <i>max. 1 Beh.</i>		<b>Gazelle SG, Barritus Rex, Basudin SG, Oryx Pro:</b> Gallmücken; <i>max. 2 Beh.</i>							
		<b>Apollo SC:</b> Spinnmilben (Eier); <i>max. 1 Beh.</i> <b>Credo, Nissostar:</b> Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen); <i>max. 1 Beh.</i>							
		<b>Schwefel:</b> Himb.-/ Bromb.-/ Gallmilbe							
<b>Envidor:</b> Spinnmilben, Himbeerblattmilbe, Bromb., Gallmilbe; <i>max. 1 Beh.</i>		<b>Envidor:</b> Spinnmilben, Himbeerblattmilbe, Brombeermilbe, Gallmilbe; <i>max. 1 Beh.</i>							
<b>Produkte mit Wartefrist</b> (Anwendung mit Wartefrist)									
		<b>Talstar, Capito Multi:</b> Himbeerkäfer; <i>max. 2 Beh.</i>			II				3 Wochen
		<b>Zenar:</b> Spinnmilben (alle Stadien); <i>max. 1 Beh.</i> <b>Kiron (HG), Spomil (K):</b> Spinnmilben (Larven, Nymphen, Adulte); <i>max. 1 Beh.</i>							
		<b>Pirimicarb, Pirimor:</b> Blattläuse; <i>max. 2 Beh.</i>							
		<b>Pyrethrum FS:</b> Blattläuse, Raupen <b>Parexan N, Sepal:</b> Blattläuse, Raupen, Blattwespenlarve							
		<b>Alanto:</b> Blattl., Blütenst., Himbeerk., <i>max. 2 Beh.</i>							
		<b>Pyrethroide:</b> Blütenst., Himbeerkäfer; <i>max. 2 Beh.</i>							
				<b>Fettsäuren:</b> Spinnmilben + Blattläuse					1 Woche
				<b>Audienz, Bandsen*:</b> Himbeerblütenstecher, Himbeerkäfer; <i>max. 2 Beh.</i>					
				<b>Telmion:</b> Spinnmilben, <i>max. 2 Beh.</i>					3 Tage
				<b>Audienz, Biohop</b> <b>Audienz, Perfetto,</b> <b>Alanto*:</b> Kirschessigfliege; <i>max. 2 Beh.</i>					

**Zu beachten:** Für das Insektizidresistenz-Management wird die Anzahl Behandlungen pro **Wirkstoffgruppe** beschränkt. Diese Gruppen sind farbig gekennzeichnet.

\*max. 2 Behandlungen/Parzelle und Jahr