



# Ribes-Arten (rote und schwarze Johannisbeere, Stachelbeere): Fungizide 2021

Nach der Ernte bzw. nach einer Neupflanzung bzw. nach dem Austrieb	Erste neue Blätter	Blütenstand-schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Früchte innerhalb der Grappen	Beginn Fruchtverfärbung	Früchte gefärbt	Wartezeit
<b>Produkte ohne Wartezeit</b> (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)								
Delan WG: Mondscheinigkeit ( <b>nur rote und schwarze Johannisbeeren</b> )								
<b>SSH: Systhane C WG, Dutop Plus:</b> Rost, Echter Mehltau, Blattfallkrankheit, <b>max. 4 Beh.</b>								
	<b>SSH: Slick, Difcor 250 EC, Bogard, SICO:</b> Echter Mehltau <b>max. 3 Beh.</b>							
	<b>Héliosoufre:</b> Echter Mehltau ( <b>nur Stachelbeere</b> )							
<b>Produkte mit Wartezeit</b> (Anwendung mit Wartezeit)								
Kupfer: Blattfallkrankheit								3 Wochen
<b>SSH: Systhane Viti, Topas, Topas vino:</b> Echter Mehltau, <b>max. 4 Beh.</b>								
<b>Legend:</b> Echter Mehltau ( <b>nur Stachelbeere</b> ); <b>max. 1 Beh.</b>								
<b>Stobilurine: Amistar, Stroby:</b> Mondscheinigkeit, Echter Mehltau; <b>max. 3 Beh.</b>								
<b>Fenicur:</b> Teilwirkung: Rost, Echter Mehltau								2 Wochen
<b>Stroblurine: Flint, Tega:</b> Echter Mehltau, Mondscheinigkeit, <b>max. 3 Behandlungen</b>								
<b>Nimrod:</b> Echter Mehltau ( <b>nur Stachelbeere</b> ), <b>max. 5 Behandlungen</b>								1 Woche
					<b>Switch, Play, Avatar:</b> Mondscheinigkeit; Graufäule ( <b>nur Stachelbeere</b> ) <b>max. 2 Beh. max. 2 Beh.</b>			3 Tage
					<b>Teldor:</b> Graufäule; <b>max. 2 Beh.</b>			
<b>Armicarb, Capito Armicarb, BIOHOP FungiCARB, Carbofort:</b> Echter Mehltau ( <b>nur Freiland</b> )								

**Zu beachten:** Die Mittel sind normalerweise für alle *Ribes*-Arten zugelassen oder auf Johannisbeeren in deutsch und "groseiller" auf französisch (welches zusammen rote und schwarze Johannisbeeren sowie Stachelbeeren umfasst). **Achtung:** Gewisse Produkte sind jedoch **nur** auf Stachelbeeren zugelassen **oder nur** auf Johannisbeeren zugelassen.

**Zu beachten:** Die Anzahl Behandlungen bezieht sich immer auf eine **Wirkstoffgruppe**, siehe die detaillierten Erläuterungen im Schema „Erdbeeren – Fungizide“

# Ribes-Arten: Johannis-, Stachelbeeren: Insektizide / Akarizide 2021

Nach der Ernte bzw. nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Winterruhe	Erste neue Blätter	Blütenknospen sichtbar	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Früchte innerhalb der Grappen angesetzt	Beginn Fruchtverfärbung	Früchte gefärbt	Wartezeit
<b>Produkte ohne Wartezeit</b> (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)									
		<b>Genol Plant, Sanoplant Winteröl:</b> Spinnmilben, Blattläuse							Bis zum Austrieb
		<b>Paraffinöle (versch.):</b> Spinnmilben, Schildl., Raupen							
		<b>Rapisal, Rappol Plus:</b> Spinnmilben, Schildläuse, Blattläuse; <i>max. 3 Beh.</i>							
Ende August- Anfangs Sept. <b>Apollo SC:</b> Spinnmi. (Eier); <i>max. 1 Beh.</i> <b>Credo, Nissostar:</b> Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen); <i>max. 1 Beh.</i>		<b>Apollo SC:</b> Spinnm. (Eier); <i>max. 1 Beh.</i> <b>Credo, Nissostar:</b> Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen); <i>max. 1 Beh.</i>							
<b>Produkte mit Wartezeit</b> (Anwendung mit Wartezeit)									
		<b>Envidor:</b> Spinnmilben (alle Stadien); <i>max. 1 Beh.</i>							3 Wochen
		<b>Zenar:</b> Spinnmilben (alle Stadien); <i>max. 1 Beh.</i> <b>Kiron (HG), Spomil (K):</b> Spinnmilben (Larven, Nymphen, Adulte); <i>max. 1 Beh.</i>							
		<b>Pirimicarb, Pirimor:</b> Blattläuse; <i>max. 2 Beh.</i>							
		<b>Pyrethrum FS:</b> Blattläuse, Raupen <b>Parexan N, Sepal:</b> Blattläuse, Raupen, Blattwespenlarve							
		<b>Alanto*:</b> Blattläuse, Napfschildlaus; <i>max. 2 Beh.</i>							
		<b>Fettsäuren:</b> Spinnmilben, Blattläuse							1 Woche
		<b>NeemAzal-T/S, Biohop DelNeem, Sanoplant Neem:</b> Blattläuse; <i>max. 2 Beh.</i>							
		<b>Audienz, Biohop Audienz, Perfetto*:</b> Kirschessigfliege; <i>max. 2 Beh.</i>							3 Tage

**Zu beachten:** Für das Insektizidresistenz-Management wird die Anzahl Behandlungen pro **Wirkstoffgruppe** beschränkt. Diese Gruppen sind farbig gekennzeichnet.

\*max. 2 Behandlungen/Parzelle und Jahr